dantanlantanlantanlantanl

Wildrebe von Bauer



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1221

May Han Baum

II 19 A 2 Wildrebe von Bauer





DESIGNATION Willowibe Von Bauer. CLOS TPLANCHE 19 RANG A souche 2 Vigueur: 2,5 PORT : érig - (1/2 érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage : 0 Date de Véraison : 17872 Date de Maturité : 4.9.72 Pourriture : 0 8 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P loxio disc. - (sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 2 avec pepins - apyrène 83 8 JUS incl - coloré

Juntanhada

DESIGNATION Wilherebe von Bauer CLOS IV PLANCHE 19 RANG A souche 2 Vigueur : 215 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Pédoncule : (L)-(M)- C Millerandage : 0 Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité: 10.9.73 x Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - M - (P) 12x12 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 t s23 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Moth witch: Wildube vm Bauer

Charles of the Analysis Andrews 2

Timure 3

Life of the Control control

Timure 3

Life of the Control control

Timure 4

Date de Industrie 4.8

Deta de Industrie 3.18 + 6. + 3

Toranture 5.0

Timure 5.0

Timure 6.0

Timure 6.0

Timure 7.0

Timure 7.0

Timure 8.0

Timure 8.0

Timure 8.0

Timure 8.0

Timure 8.0

Timure 8.0

Timure 9.0

Année: 1974
Emplacement ... IV. 19 A 2 Désignation Wild Mète. Non Bayur

! !	! Nombre ! Total	DATES !				
!	i d'yeux	1913	1 25 3	29.3 : ! !		
1 1	! 2	1	1 1	1 2 , 1		
! 2	12	0	! 0	11 1 1		
! 3	2	0	! 0	11 *		
! 4	12	!	1	De 29-3-712 (-1)		
1 5	194	0	10	1 0624-3-1		

lantanlanta

Année: 1972
Emplacement IV. 19 A 2 Désignation / Wilherèbe Von Buner

=== ! !		Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
ī			43.3	133	!	!	1 ! !		
1	1	2	D	11	or!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
! !	2 !	4	4	! 2	+!	!	!!!!!!!!!!		
! !	3 8	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		9	!	0 le 173.72	+ ! !		
1	4 8	! !		1	į	1 !	(-2)		
!	5 8	!		!	!	1	1 1 1		

Année: 1973

Emplacement . II 19-A2 Désignation Wildriche Von Bauer

! ! Nombre ! Total		!	! DATES!					
!	!	1	x! 19-3	23-3	! 28-3			
- !	1	1 }	!	! -	! !			
!	2	! 4	! 0	! 0	11			
1	3	1 9	! -	! -	!			
!!	4.	! 2	! 0	0	11 *	Dl. 28-3-732 - 1		
1 1	5	! 2	! 1	! 1	! 2 -			

Désignation: Wildre de Von bouer Emplacement: II -19 A 2 1-4

Juntaglanta

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

épanoui O- moyon 2 - globuleux 3. 41 -

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 3 - duvoteux 8 -41 -

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé cuivré 4 - jaune - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées en gouttière autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 75duvetcuses (8) cotonneuses 9.
- 44 blanches (fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calus 69

dantanlantijakadanlantand

Wildrebe von bauer.

Désignation:

Emplacement: IV 19 A 2 A 4

Luntumburita

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Dduveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 6 =

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 = entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

alantanlantanlagimi mitud

Vildrebe Von bauer

dantanlantanlantanlantan)

Désignation :

Inntroduction

Emplacement: III 19 A2 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O- à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo69

Désignation: Wildrebe von bauer

Emplacement: I 19A2'1.5

Juntandurch

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - potito 1 - noyenno 2 - grando 5.

Face supérioure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -

Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inf\(\text{inf\(\text{verte} \) 1 - particllement rouge \(\text{perticle rouge} \) 28 - cntièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonnoux 6 - partiellement 7 - totalement

40 - coloré D- partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Wildrebe von bauer -4.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3,9

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 cêtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6, non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore T-coloré Prosest
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A savour noutro 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de coulour : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8)- irrégulière 9.
- 32 A bourrolet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court moyen long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calus H

```
Wildrice von Cauer
DEHOMINATION :
EMPLACEMENT : III -19 A 2 A-5
                                     SARMENT DE VIGNE
                          : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2) muyen
: ramifié (1), peu ramifie (2)
Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2),
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                            autre (4).
                          unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                           : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

toutouloute

Calvo 70

```
Désignation: Wildrebe Von Bauer
 Nº d'ordre : M
                                     = VII 20 A1
 Origine :
Emplacement: IV 19 A2
8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. 4
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 5
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 3 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ...... (1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L; 3 ..... 1)-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme
                            : 4 - 5.
```

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Touring limite

Domergue 80